



**E-AHPBA Consensus Conference on NET Liver Metastases  
12 – 13 December 2012, London, UK**

***Test di autovalutazione del livello di conoscenza delle problematiche elencate.***

<b>Sessione</b>	<b>Domande</b>	<b>Oratore</b>
<b>1</b>	Qual è l'incidenza, la prevalenza e la prognosi dei NETs e dei NETs con metastasi epatiche alla diagnosi?	<b>B.Gustafsson</b>
<b>2</b>	Pazienti con basso indice proliferativo (Ki67) dovrebbero essere monitorizzati per la diagnosi precoce di metastasi epatiche?	<b>G. Rindi</b>
<b>3</b>	La caratterizzazione genetica e la presenza di cellule tumorali circolanti dovrebbero essere utilizzati come indici predittivi di sviluppo di metastasi epatiche e di risposta ai trattamenti?	<b>M. Kidd</b>
<b>4</b>	Quali marcatori biochimici dovrebbero essere utilizzati per il follow-up post-trattamento delle metastasi epatiche?	<b>K. Öberg</b>
<b>5</b>	Quale tipologia di <i>imaging</i> morfologica dovrebbe essere usata per valutare la resecabilità delle metastasi epatiche con intento curativo?	<b>V. Vilgrain</b>
<b>7</b>	Abbiamo necessità di biopsiare sia il tumore primitivo che le metastasi epatiche per le decisioni terapeutiche sul trattamento delle metastasi epatiche?	<b>N. Heaton</b>
<b>8</b>	Quando dovrebbe essere effettuata la resezione epatica?	<b>G. Poston</b>
<b>10</b>	Quando dovrebbe essere effettuato il trapianto?	<b>S. T. Fan</b>
<b>11</b>	Che ruolo ha la terapia adiuvante e neoadiuvante?	<b>T.van Gulck</b>
<b>12</b>	Quando utilizzare i trattamenti ablativi (RFA, crioterapia, termoablazione)?	<b>A. Sipperstein</b>
<b>13</b>	Quale metodica angiografica epatica dovrebbe essere utilizzata?	<b>A. Kennedy</b>
<b>14</b>	Quando far uso della terapia metabolica?	<b>D. Kwekkeboom</b>
<b>15</b>	Quando utilizzare la chemioterapia, la target therapy o la bioterapia?	<b>M. E. Caplin</b>